

RECOMENDACIONES SOBRE LARINGITIS EN PEDIATRÍA

¿QUÉ ES LA LARINGITIS?

Es una inflamación de la laringe producida, generalmente, por una infección vírica. Suele cursar con tos perruna, afonía, ronquera, dolor de garganta, fiebre y, a veces, un ruido al coger el aire (estridor). Suele empeorar por la noche.

¿QUÉ DEBE HACER EN CASA?

- Evite el ambiente seco en casa, ponga depósitos de agua en los radiadores.
- La humedad puede mejorar los síntomas: mantenga al niño en el baño con los grifos de agua caliente abiertos o haga que respire el aire fresco de la calle sacándole abrigado a la ventana o a la terraza.
- Si el niño tiene fiebre administre el antitérmico recomendado habitualmente por su pediatra.
- Es normal que su hijo esté inapetente. No le fuerce a comer. Ofrezcale líquidos.
- Vigile la respiración del niño. En algunos casos, la inflamación de la laringe dificulta la entrada de aire.

¿CUÁNDO DEBE ACUDIR A UN SERVICIO DE URGENCIAS?

- Cuando haga ruido al coger el aire (estridor) aunque el niño esté tranquilo.
- Si la dificultad respiratoria empeora: respira más deprisa, se le marcan las costillas, mueve mucho el abdomen, se le hunde el pecho o estira el cuello.
- Cuando el niño tenga dificultad para tragar o babee mucho.

CUESTIONES IMPORTANTES

- La mayoría de las laringitis son leves y benignas.
- No necesitan tratamiento antibiótico.
- No se deben emplear collarines de agua y alcohol. No son efectivos y, además, pueden irritar la piel.
- No administre jarabes, ni supositorios para la tos sin consultar con su pediatra.